

فرایند جراحی



- عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی یا موضعی (بی حسی نخاعی) انجام می‌شود. در این مورد شما تا حدودی حق انتخاب دارید و در اتاق عمل میتوانید با متخصصین بیهوشی صحبت کنید.
- پس از مشخص شدن نوع بیهوشی، در موقعیت دراز کش و پا باز رو به جلو روی تخت دراز میکشید.
- جراح با استفاده از پروب داخل مقعدی دستگاه سونوگرافی ابتدا موقعیت پروستات را بررسی میکند.
- سپس با استفاده از سوزن بیوپسی مسلح شده از نواحی مشکوک و غیر مشکوک نمونه برداری انجام میشود.
- سپس هر نمونه داخل یک ظرف و در مجموع 12 ظرف از طریق اتاق عمل به واحد پاتولوژی ارسال میشود.
- در نهایت برای بیمار در صورت نیاز سوند تعبیه میشود.

آشنایی با عمل جراحی TRUS BX

نمونه برداری از پروستات یکی از شایع ترین و متداول ترین روش های نمونه برداری از پروستات میباشد که توسط متخصصان رادیولوژی و متخصصان اورولوژی انجام میشود. در این روش با کمک دستگاه سونوگرافی از طریق مقد حدودا 12 نمونه بافت پروستات برداشته میشود و جهت تشخیص بدخیمی یا خوش خیمی به واحد پاتولوژی ارسال میشود.

آماده سازی قبل از جراحی

- تمامی سوالات خود را با پزشک معالج مطرح کنید.
- اگر دارویی مصرف می‌کنید یا بیماری خاصی دارید، پزشک را مطلع کنید.
- ممکن است نیاز به انجام آزمایش‌های خون و ادرار و تصویربرداری مانند سونوگرافی یا سی اسکن باشد.
- بنا بر سن و بیماری‌هایی که دارید ممکن است قبل از عمل، به صلاح دید پزشک معالج، جهت اخذ اجازه عمل جراحی از سایر همکاران از قبیل بیهوشی و قلب و ... مشاوره دریافت کنید.
- ممکن است شب قبل عمل و یا صبح روز عمل بستری شوید.

- از نیمه شب قبل از جراحی نباید چیزی بخورید یا بنوشید و از داروهایی مثل پودر پگ و شیاف بیزاکودیل جهت آماده سازی روده و پاکسازی آن جهت جلوگیری از عفونت، با دستور پزشک استفاده کنید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم

نمونه برداری پروستات با کمک سونوگرافی



شناسنامه پمفلت آموزشی کد SU-12-04

عنوان	نمونه برداری پروستات با کمک سونوگرافی (TRUS)
تهیه کننده	دکتر فردین عسگری جراح متخصص کلیه و مجاری ادراری - خانم ام البنین بشیر زاده پرستار
تأییدکننده	دکتر فردین عسگری جراح متخصص کلیه و مجاری ادرار
سال تهیه	1404
سوپروایزر آموزشی	ایرماریحانی
رفرنس	- پمفلت بیمارستان سینا تهران http://iec.behdasht.gov.ir

عوارض ممکن

1- ادرار خونی:

حتماً با پزشک خود درمیان بگذارید و از ایشان در مورد طبیعی بودن رنگ ادرار سوال کنید. ادرار خونی خفیف به زودی با مصرف مایعات بهبود میابد.

2- خون ریزی مقعدی:

اگر در حد یک یا دو نوبت باشد طبیعی است ولی اگر خون ریزی مداوم باشد و شما را نیازمند استفاده از پد بهداشتی کرده و یا منجر به علائمی مثل سرگیجه و افت فشارخون شد سریعاً به پزشک یا پرستار خود اطلاع دهید.

3- تب و لرز:

این علامت بعد بیوپسی پروستات نشان دهنده عفونت بعد از عمل میباشد لذا در صورت بروز تب و لرز جهت شروع آنتی بیوتیک مناسب چه در حین بستری و چه در زمان ترخیص با پزشک خود حتما مشورت کنید.

4- درد مقعد و سوزش ادراری:

این علائم دو تا سه روز پس از عمل طبیعی بوده و از مسکن های معمول جهت درمان آن استفاده کنید. اگر درد مقعد با هرکدام از علائم فوق بروز پیدا کرد حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

توصیه پس از ترخیص

⊙ در صورت بروز هر گونه علائم غیرعادی مانند تب، درد شدید مقعد، ادرار خونی شدید، یا مشکل در دفع ادرار و مدفوع، فوراً با پزشک تماس گرفته و یا به اورژانس بیمارستان مراجعه فرمایید.

⊙ یک ماه کاری پس از ترخیص از بیمارستان با دریافت نتیجه پاتولوژی از واحد پذیرش آزمایشگاه بیمارستان، به درمانگاه مراجعه کنید.

نتیجه گیری:

بیوپسی پروستات در زمانی که اورولوژیست شما به بدخیمی پروستات مشکوک باشد یکی از ساده ترین و ارزانتترین راه ها جهت تشخیص است.

با توجه به نکات ذکر شده توسط کادر درمان یکی از ساده ترین اعمال جراحی را تجربه خواهید کرد.



بیمارستان پیامبراعظم(ص) قشم

با آرزوی سلامتی و بهبودی سریع

برای شما