


خارج سازی تومور مثانه از طریق پیشابراه TURBT



آشنایی با عمل جراحی TURBT

برداشتن تومور مثانه از طریق مجرا یا همان عمل TURBT از دسته عمل های اندوسکوپی و بدون برش در اورولوژی میباشد که از طریق وسیله ای به نام رزکتوسکوپ از طریق مجاری ادراری وارد سیستم ادراری و مثانه شده و تومور از بستر خود برداشته شده و خارج میشود.

آماده سازی قبل از جراحی

تمامی سوالات خود را با پزشک معالج مطرح کنید.
اگر دارویی مصرف می کنید یا بیماری خاصی دارید، پزشک را مطلع کنید.
ممکن است نیاز به انجام آزمایش های خون و ادرار و تصویربرداری مانند سونوگرافی یا سی اسکن باشد.

بنا بر سن و بیماری هایی که دارید ممکن است قبل از عمل ، به صلاح دید پزشک معالج ، جهت اخذ اجازه عمل جراحی از سایر همکاران از قبیل بیهوشی و قلب و ... مشاوره دریافت کنید.
ممکن است شب قبل عمل و یا صبح روز عمل بستری شوید.
از نیمه شب قبل از جراحی نباید چیزی بخورید یا بنوشید

فرایند جراحی

عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی یا موضعی (بی حسی نخاعی) انجام می شود. در این مورد شما تا حدودی حق انتخاب دارید و در اتاق عمل میتوانید با متخصصین بیهوشی صحبت کنید.

پس از مشخص شدن نوع بیهوشی، در موقعیت درازکش و پا باز رو به جلو روی تخت دراز میکشید جراح با استفاده از وسیله ای به نام سیستم اسکوپ ابتدا وارد مجرا و سپس مثانه میشود و محل دقیق توده را پیدا میکند سپس سیستم اسکوپ خارج میشود و با استفاده از وسیله ای به نام رزکتوسکوپ وارد مثانه میشود و توده را تا حد امکان می تراشد و بقایای تومور را خارج میکند. این بقایا به واحد پاتولوژی جهت تعیین نوع توده و نحوه برخورد با آن در مراحل بعدی ارسال میشود.

در انتهای عمل به علت دستکاری ادراری و وجود زخم های داخل مثانه که ناشی از برداشتن تومور میباشد، سوند ادراری برای شما کار گذاشته میشود که طبق صلاح دید پزشک ممکن است تا 10 روز باقی بماند

در اکثر موارد جهت جلوگیری از به وجود آمدن لخته به سوند شما سرم شست و شو جهت پاکسازی مثانه وصل میباشد که حتما میزان سرعت آن را با پزشک و پرستار خود چک کنید. (در صورت پررنگ شدن ادرار و قرمز شدن بیش از حد آن سرعت شست و شو بیشتر شود. در غیر این صورت به شکل قطره ای کافی میباشد.)

شناسنامه پمفلت آموزشی کد SU-14-04	
عنوان	خارج سازی تومور مثانه از طریق پیشابراه TURBT
تهیه کننده	دکتر فردین عسگری جراح متخصص کلیه و مجاری ادراری - ام البنین بشیر زاده پرستار
تایید کننده	دکتر فردین عسگری جراح متخصص کلیه و مجاری ادرار
سال تهیه	1404 آذر
سوپروایزر آموزشی	ایرماریحانی
سرپرستار	فرشته فاطمی
رفرنس	- پمفلت بیمارستان سینا تهران http://iec.behdasht.gov.ir

مراقبت‌های بعد از جراحی

1. بستری شدن:

معمولاً نیاز به بستری کوتاه‌مدت نهایتاً یک تا سه روزه در بیمارستان است (در صورت آزمایشات مختل و یا عوارض حین عمل جراحی بدبپی است بسته به صلاح پزشک مربوطه تعداد روزهای بستری افزایش یابد) بنا به صلاح دید ممکن است یک تا چند روز در بخش ویژه مثل CCU یا ICU بستری باشید.

2. درد و داروها:

درد معمولاً با داروهای مسکن معمولی کنترل می‌شود. ممکن است داروهای آنتی‌بیوتیک برای جلوگیری از عفونت تجویز شوند.

جهت درمان سوزش ادرار ممکن است از دارویی استفاده شود که رنگ ادرار را نارنجی میکند پس از مشاهده این موضوع نگران نباشید و آن را با پزشک یا پرستار خود در میان بگذارید.

3. فعالیت‌های روزانه:

از شب بعد از عمل فعالیت‌های خود را از سر بگیرید و این نکته را به یاد داشته باشید که سوند ادراری هر چند روز که به شما وصل باشد نباید مانع حرکت کردن شما بشود.

نکات رژیم غذایی:

جهت جلوگیری از کاهش کارکرد کلیه که بعد از این عمل به وجود می‌آید، حد اقل روزانه 8 لیوان آب بنوشید. در صورت وجود سوزش ادراری، استفاده از غذاهای تند، ترش، کافئین دار (نوشابه، چای پررنگ، قهوه و نسکافه و ...) را به حداقل برسانید.

شیمی درمانی داخل مثانه ای فوری

گاهی بر اساس نظر پزشک لازم است که تا 6 ساعت پس از عمل یک نوبت شیمی درمانی داخل مثانه ای برای بیمار انجام شود، در این مواقع همراه بیمار با دریافت کد نسخه از پزشک خود به داروخانه مراجعه کرده و دارو را تهیه میکند و این دارو توسط پزشک تزریق شده و یک ساعت بعد از مثانه خارج میشود.

عوارض ممکن

عوارض عمل TURBT میتواند شامل تب و لرز و عفونت شدید، درد شدید پهلوی، آسیب به کلیه ها، حالب ها و مثانه و مجرای ادرار، احتمال پارگی مثانه به علت حجم بالای تومور و تعبیه درن داخل شکمی، تنگ شدن مجرا و اختلال در ادرار کردن میباشد.

توصیه پس از ترخیص

در صورت بروز هر گونه علائم غیرعادی مانند تب، درد شدید پهلوی، ادرار خونی شدید، یا مشکل در دفع ادرار، فوراً با پزشک تماس گرفته و یا به اورژانس بیمارستان مراجعه فرمایید.

حتماً در تاریخ معین شده که معمولاً دوهفته کاری از عمل شما میباشد جهت دریافت جواب پاتولوژی به واحد آزمایشگاه مراجعه کنید و سپس در درمانگاه اورولوژی جهت تعیین برنامه بعدی درمان، حاضر شوید

نتیجه گیری:

عمل جراحی TURBT یک روش موثر برای درمان تومور مثانه و بهبود و راحتی بیمار است. رعایت دقیق توصیه‌های پزشک قبل و بعد از عمل، نقش مهمی در موفقیت جراحی و بهبودی سریع‌تر شما دارد.



بیمارستان پیامبراعظم (ص) قشم

با آرزوی سلامتی و بهبودی سریع برای

شما