

شناسنامه پمفلت آموزشی کد SU-20-04

عنوان	هیدروسلکتومی (خارج کردن هیدروسل)
تهیه کننده	دکتر فردین عسگری جراح متخصص کلیه ومجاری ادارى- ام الینین بشیر زاده پرستار
تاییدکننده	دکتر فردین عسگری جراح متخصص کلیه ومجاری ادارى
سال تهیه	1404 آذر
سوپروایزر آموزشی /کارشناس آموزش سلامت	ایرماریحانی/خدیجه سیاسر نژاد
سرپرستار	فرشته فاطمی
رفرنس	- پمفلت بیمارستان سینا تهران http://iec.behdasht.gov.ir

آشنایی با عمل جراحی هیدروسلکتومی

هیدروسلکتومی یک روش جراحی برای برداشت هیدروسل، تجمع غیرطبیعی مایع در اطراف بیضه ها، است. این عمل جراحی به منظور کاهش تورم و درد و بهبود راحتی بیمار انجام می شود.

آماده سازی قبل از جراحی

تمامی سوال های خود را با پزشک معالج مطرح کنید.

اگر دارویی مصرف می کنید یا بیماری خاصی دارید، پزشک را مطلع کنید.

ممکن است نیاز به انجام آزمایش های خون و تصویر برداری مانند سونوگرافی باشد.

برخی داروها مانند آسپرین و رقیق کننده های خون باید چند روز قبل از عمل قطع شوند. پزشک شما دستورالعمل دقیقی در این زمینه ارائه خواهد داد.

از نیمه شب قبل از جراحی نباید چیزی بخورید یا بنوشید.

فرایند جراحی

عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی یا موضعی (بی حسی نخاعی) انجام می شود. در این مورد شما تا حدودی حق انتخاب دارید و در اتاق عمل میتوانید با متخصصین بیهوشی صحبت کنید.

جراح یک برش کوچک در کیسه بیضه یا ناحیه کشاله ران ایجاد می کند .

مایع اضافی تخلیه و غشاهای اطراف بیضه برداشته یا تغییر شکل داده می شوند تا از تجمع مجدد مایع جلوگیری شود.

در نهایت یک شیء از جنس لاتکس در کیسه بیضه تحت عنوان درن کار گذاشته میشود که فردای عمل جراحی خارج میگردد.

برش ها با بخیه قابل جذب بسته می شوند و دیگر نیازی به خارج سازی بخیه نمی باشد.

مراقبت های بعد از جراحی

بستری شدن:

معمولاً نیاز به بستری کوتاه مدت نهایتاً یک روز در بیمارستان است.

درد:

معمولاً با داروهای مسکن معمولی کنترل می شود.

داروها:

ممکن است داروهای آنتی بیوتیک برای جلوگیری از عفونت تجویز شوند.

استفاده از یخ:

برای کاهش تورم و درد می توانید از کیسه یخ در محل جراحی استفاده کنید.

پوشیدن لباس های مناسب:


پوشیدن لباس های آزاد و راحت و استفاده از حمایت کننده های بیضه (شورتکس) توصیه می شود.

فعالیت های روزانه:

✿ به مدت یک هفته یا بیشتر از انجام فعالیت های سنگین و ورزش خودداری کنید.

✿ به تدریج و با مشورت پزشک فعالیت های روزمره خود را از سر بگیرید.

عوارض ممکن



توصیه پس از ترخیص

در صورت بروز هر گونه علائم غیرعادی مانند تب، درد شدید، قرمزی یا تورم در محل جراحی، یا مشکل در دفع ادرار، فوراً با پزشک تماس گرفته و یا به اورژانس بیمارستان مراجعه فرمایید.

مراقبت از محل جراحی:

محل جراحی را تمیز و خشک نگه دارید و دستورات پزشک را در مورد پانسمان رعایت کنید.

مراجعه به درمانگاه جهت ویزیت مجدد

در صورت عدم وجود مشکل خاص که معمولاً قبل از ترخیص پزشکان شما را مطلع میکنند، یک هفته پس از ترخیص جهت معاینه جراح به درمانگاه بیمارستان مراجعه فرمایید.

نتیجه گیری:

عمل جراحی هیدروسلیکتومی یک روش موثر برای درمان هیدروسل و بهبود راحتی بیمار است. رعایت دقیق توصیه های پزشک قبل و بعد از عمل، نقش مهمی در موفقیت جراحی و بهبودی سریع تر شما دارد.

بیمارستان پیامبراعظم(ص) قشم

با آرزوی سلامتی و بهبودی سریع

برای شما