

برنام، هستی، بخش



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان



بیمارستان پیامبر اعظم صی قسم

انوکسپارین (کلگزان) ENOXAPARIN

طبقه بندی درمانی : کلگزان نوعی داروی
ضد انعقاد است که برای کاهش میزان خطر
ایجاد لخته های خونی استفاده می شود.

موارد منع مصرف : حساسیت شدید، کاهش
پلاکت خون، خونریزی فعال

موارد احتیاط : زخم معده، افراد مسن،
نارسایی کلیوی، عفونت بافت قلب
باکتریال، آسیب به شبکه به دنبال دیابت
و پرفشاری خون شدید کنترل نشده

مراقبت های زمان مصرف انوکسپارین



شناسنامه پمفلت آموزشی کد CCU-1-97	
عنوان	مراقبت های زمان مصرف انوکسپارین
تهیه کننده	سودابه ابراهیمی کارشناس پرستاری
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۳۹۷ تابستان
ناظر کیفی	متخصص قلب و عروق سوپروایزر آموزش به بیمار ایرما ریحانی
دکتر احمد مسعودی	

منابع:

کتاب بروئر و سودارث پرستاری ۲۰۱۸ فصل ۲۳
بروشور دارو

مراقبت های در منزل:

۱. پس از تزریق محل تزریق را ماساژ ندهید.
۲. بیمار داروهای مثل آسپرین را مصرف نکند مگر این که طبق دستور پزشک تجویز کننده باشد.
۳. استفاده از کیسه یخ می توان کبودی محل تزریق را برطرف سازد.
۴. در صورت زمین خوردن یا وارد شدن ضربه به سر ، حاملگی یا تصمیم به حاملگی و مشاهده هر گونه علائم یا حالت های غیر طبیعی به پزشک خود اطلاع دهید.
۵. به منظور پیشگیری از خونریزی لثه از مسواک های دندان نرم استفاده شود.
۶. کلگزان را باید تا مدت زمانی که پزشک دستور می دهد زیر پوست خود تزریق نمائید.
۷. کلگزان باید هر روز سر ساعت معینی تزریق شود.
۸. دارو به صورت چرخشی در اندامها و پوست شکم تزریق شود.
۹. در صورت استفاده از داروی های دیگر و مکمل های غذایی یا گیاهی به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورت مشاهده هر کدام از عوارض زیر به پزشک خود مراجعه کنید:

۱. خونریزی از محل زخم جراحی، هر نوع خونریزی از محل تزریق ، لثه، بینی، دانه های قرمز روی پوست بدن، مدفوع سیاه و قیری و وجود خون در ادرار که ادرار به رنگ صورتی یا قهوه ای تیره می شود.
۲. در بیمارانی که تحت بی حسی کمری قرار گرفته اند نشانه های عصبی مانند تغییر سطح هوشیاری، سردرد شدید و بی حسی اندامها را گزارش کنید.
۳. مشاهده خون در هنگام سرفه کردن و یا استفراغ خونی
۴. کبودی غیر عادی که در اثر ضربه یا علت واضح دیگری ایجاد نشده باشد.