

به نام هستی بخش

ختنه در پسران



ختنه نوزاد پسر، عمل جراحی است که طی آن پوست انتهایی پوشاننده آلت تناسلی مردانه برداشته می شود. آمارنشان می دهد عفونت های اداری در پسر بچه های ختنه نشده به مراتب بیشتر از پسرهای ختنه شده است.

بهترین زمان ختنه کردن:

اگر ختنه بعد از تولد در ماه های اول تولد انجام گیرد اولاً احتیاج به بیهوشی عمومی کودک ندارد و با بی حسی موضعی انجام می شود . ثانیاً هزینه زیادی برای خانواده نخواهد داشت . خصوصاً اگر بهداشت و نظافت بعد از عمل رعایت شود محل زخم زودتر التیام می یابد . پزشکیانی که ختنه انجام می دهند از بی ح سی موضعی استفاده می کنند و به این صورت کودک دردی احساس نمی کند و به خوبی آنرا تحمل می کند.

روش های مختلف ختنه کردن:

گذاشتن حلقه پلاستیکی

ختنه کردن با روش بریدن و دوختن

شناسنامه پمفلت آموزشی کد OR-2-97	
عنوان	ختنه در پسران
تهیه کننده	رعنا ناصری کارشناس بیهوشی
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۳۹۷ تابستان
ناظر کیفی	متخصص جراحی
دکتر سارا اکبرنژاد	سوپروایزر آموزش به بیمار
دکتر امیر مسعود عزیز پور	ایرما ریحانی

منابع: کتاب راهنما خودمراقبتی خانواده ۱ سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۳۹۴

مراقبت بعد از ختنه:

۱. در ۲۴ ساعت اول بعد از ختنه برای تمیز کردن نوزاد بعد از مدفوع کردن از دستمال مرطوب استفاده کنید و از شستشوی محل ختنه پرهیز کنید.
۲. از ۲۴ ساعت بعد از ختنه، محل عمل کودک را تا یک هفته با آب گرم و شامپو بچه، بشوید.
۳. طبق دستور پزشک بیمار در صورت نیاز اریترومايسين روی آلت تناسلی کودک روزی دوبار قرار دهید.
۴. کودک ممکن است برای ساعاتی پس از عمل بی قراری کند یا درد داشته باشد. در ۲۴ ساعت اول بعد از ختنه شیاف یا قطره استامینوفن طبق دستور پزشک به کودک دهید.
۵. به منظور پیشگیری از عفونت طبق دستور پزشک برای فرزندان از شربت سفالکسین استفاده کنید.
۶. نخ های بخیه محل ختنه خود به خود می افتد در صورت آنکه بعد از ۱۰ روز نیفتد به پزشک مراجعه کنید.
۷. برای جلوگیری از فشار به محل ختنه از پوشاندن شلوار و لباس تنگ به کودک تا بهبودی کامل خودداری کنید. از پوشاک سایز بزرگ استفاده کنید و مواقعی که کودک را در آغوش می گیرید سعی کنید به محل بخیه فشار وارد نشود.
۸. در صورت بستری بودن کودکانی که بیمه هستند در بهارستان پس از ترخیص می توانید از داروخانه نسخه وی را که در دفترچه توسط پزشک تجویز شده با بیمه دریافت و خرید نمایید.

چه وقت به پزشک یا مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید:

۱. اگر کودک خونریزی فعال داشت (لکه های خون بزرگ تر از قطر ۲-۳ سانتی متر) در اینصورت برای کم کردن خونریزی با انگشت شصت و اشاره به صورت حلقه اطراف آلت کودک را ۵ دقیقه فشار دهید و کودک را سریع به اورژانس ببرید.
۲. اگر قرمزی پوست به شکم و پاها انتشار یابد.
۳. در صورت تب و بی اشتهایی که ادامه داشته باشد.
۴. در صورت تهوع و استفراغ
۵. مشاهده ترشح زرد رنگ از محل بخیه
۶. در صورت مشکل در ادرار کردن بعد از ختنه
۷. اگر نوزاد ۶ الی ۸ ساعت بعد از ختنه ادرار نکند (حداکثر تا ۲۴ ساعت)
۸. قرمزی و تغییر رنگ و تیره شدن نوک آلت

توجه:

برای مراقبت از محل ختنه باید از استفاده ترکیبات خانگی و

مواد سنتی یا گیاهی و یا هرگونه دارو بدون دستور پزشک

خودداری گردد.

با آرزوی بهبودی نوزاد دلبندتان

